

Bantuan Dalam Induksi Partus

1. Uterotonika

- 'drug' yang menginduksi kontraksi uterus

Contoh:

I. Oxytocin

- Diberikan pada kala II dan kala III
- Kala II → kontraksi uterus untuk kelahiran bayi (mengurangkan/memendekkan tempoh kala II)

- Kala III → kontraksi uterus untuk mengurangi pendarahan

II. Ergometrine, Methylergometrine

III. Prostaglandin

- Dimasukkan ke dalam vagina dan ke posterior fornix
- Digunakan untuk mematangkan serviks sebelum induksi oleh oxytocin

IV. Syntocinon

2. Amniotomi/ ARM (Artificial Rupture of Membrane)

- Sejenis alat digunakan untuk memecahkan kantung ketuban

3. Episiotomi

- Pemotongan perineum untuk membesarkan diameter jalan lahir

- Teknik:

I. Mediolateral

II. Midline

4. Forceps

- Terbagi:

- I. Kjeiland's

- II. Simpson's

- Digunakan untuk membantu kelahiran jika kontraksi uterus tidak cukup untuk menolak bayi keluar
- Bayi harus dilahirkan dengan cepat karena fetal distress
- Kedudukan bayi tidak normal (memutarakan kepala bayi) semasa ibu mencedan
- Bayi tersekat di jalan lahir

5. Ventouse (Vacuum Extraction)

- Mengurangkan trauma pada vagina
- Mengurangkan kecenderungan episiotomi
- Anestesi kurang diperlukan
- Keburukan: memar atau bengkak pada kulit kepala bayi tp tidak serius dan akan pulih selepas beberapa hari